



## STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Šrobárova 48  
Praha 10  
100 42

Ministerstvo zdravotnictví ČR  
Vážená paní  
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.  
ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví  
a zástupkyně hlavního hygienika ČR

VAS  
DOPIS           MZDR 21880/2014-1/OVZ  
ZN.:  
ZE DNE:       10.dubna .2014  
NASE  
ZN.:           SZU/1367/2014

VYRIZUJ  
E:             Dr.Melicherčíková  
TEL./FAX       267082284  
:  
E-MAIL:       melichercikova@szu.cz

DATUM:       29.4.2014

### Věc: odborné stanovisko k optimálnímu ošetření zubařských násadců v podmínkách ČR

Vážená paní ředitelko,

k dotazu ohledně nutnosti požadavku sterilizace pro veškeré zubolékařské násadce pro veškeré jimi prováděné výkony v České republice podle platné legislativy sděluji následující:

1. V českých právních podmínkách ( Vyhláška MZ ČR č.306/2012 Sb.) platí, že při stomatologických výkonech je nutné používat sterilní zdravotnické prostředky, tedy i sterilní zubolékařské násadce pro každého pacienta.
2. Při nákupu nových stomatologických souprav by se měli preferovat výrobci, kteří v ceně nabízejí takové množství a sortiment násadců, které je pro ordinace potřebné na jednu pracovní směnu, případně které lze během doby ordinace resterilizovat. Při předsterilizační přípravě a následné sterilizaci se postupuje podle doporučení výrobce zubolékařských násadců.
3. Sterilní zubolékařské násadce by se měly používat u pacientů, kteří mají sníženou imunitu, pro onkologické pacienty při radiační, hormonální a cytostatické léčbě apod.
4. Po ošetření pacienta, který je nosičem nebo má infekce přenášené krví a ostatním biologickým materiálem je nutné násadce před použitím u dalšího pacienta dekontaminovat a sterilizovat.
5. Při běžném neinvazivním ošetření, dentální hygieně a tam, kde nedochází ke krvácení je možné povrch násadce po ošetření pacienta dezinfikovat otřením dezinfekčním přípravkem s baktericidním, fungicidním a virucidním účinkem. Všechny násadce se sterilizují s ostatními zdravotnickými přístroji po skončení pracovní doby.
6. O nutnosti sterilizace zubolékařských násadců nebo pouze o možnosti jejich dezinfekce otřením mezi pacienty by měl z odborného medicínského hlediska rozhodnout ošetřující lékař. Při ošetření pacienta by měl na základě dosavadních vědeckých znalostí minimalizovat zdravotní rizika včetně přenosu infekce.
7. Orgány ochrany veřejného zdraví mohou při kontrolní činnosti z důvodů epidemiologicky závažných sterilizační a dezinfekční režim stomatologického pracoviště upravit a zpřísnit.

S pozdravem

  
Ing. Jitka Sosnovcová  
ředitelka